

帯状疱疹ワクチン比較

	シングリックス		ビケン	
ワクチン種別	不活化ワクチン		生ワクチン	
対象者	50・55・60歳	65・70・75・80・85・90・95・100歳	50・55・60歳	65・70・75・80・85・90・95・100歳
助成金額	任意 5,000円×2回	定期	任意 2,000円×1回	定期
接種費用	一般 22,000円×2回 松戸市助成対象者 17,000円×2回	6,500円×2回	一般8,800円 松戸市助成対象者 6,800円	2,500円×1回
接種回数	2回（2回目は初回接種の2か月後6か月以内）		1回	
接種方法	筋肉注射		皮下注射	
発症抑制	約90%以上 約9年以上有効		約50% 約5年有効	
神経痛抑制効果	約85%以上		約67%	
副反応	接種部位の痛み、発赤、腫れ 筋肉痛、倦怠感、頭痛		接種部位の発赤、掻痒感、 熱感、腫れ、痛み	
接種が受けられない人	・ 明らかな発熱（37.5℃以上）がある ・ 重篤な急性疾患にかかっている ・ 本剤の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある			
			以下の治療を受けている ・ 免疫抑制治療 ・ ステロイド治療 ・ 抗リウマチ治療 ・ 抗がん剤治療	
他のワクチンとの併用	制限なし		生ワクチン（注射）同士は中27日以上あける 不活化ワクチンは制限なし	